

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

SPONSOR® MZ

NÚMERO DE REGISTRO

21.748

COMPOSICIÓN

Metalaxil 8% p/p (80 g/kg), Mancozeb 64% p/p (640 g/kg).

FORMULACIÓN

Polvo mojable (WP).

DESCRIPCIÓN

SPONSOR® MZ combina la actividad sistémica de Metalaxil y preventiva de Mancozeb frente a Mildiu (Plasmopara viticola) en vid; mildiu (Phytophthora infestans) en tomate y berenjena en campo e invernadero; mildiu (Phytophthora infestans) y alternaria (Alternaria solani) en patata y moho azul (Peronospora hyoscyami) en tabaco.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA



H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H361d Se sospecha que daña al feto.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P201+P202 Pedir instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

P261 Evitar respirar el polvo y la niebla de pulverización.

P280 Llevar guantes y prendas de trabajo.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P391 Recoger el vertido.

P501 Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.



El preparado no se usará en combinación con otros productos.

ATENCIÓN

PRESENTACIÓN

Envases de 1 y 5L.

FICHA TÉCNICA

APLICACIONES AUTORIZADAS Y DOSIS DE EMPLEO

Cultivo	Enfermedad	Dosis (kg/ha)	Volumen de caldo (l/ha)	Plazo de seguridad (días)	Condiciones de uso
Vid (uva de mesa y vinificación)	Mildiu	2,5	400-1000	28	Realizar 1-2 aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días. Aplicar desde la cuarta hoja desplegada hasta comienzo de la maduración; las bayas comienzan a brillar (BBCH 14-81). La aplicación del producto se realizará de forma preventiva cuando el nivel de la enfermedad sea bajo
Tomates (aire libre e invernadero)	Mildiu	2,5	400-1000	21	Realizar 1-4 aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días. Aplicar desde la cuarta hoja verdadera del tallo principal desplegada hasta el 70% de los frutos muestra el color típico de madurez (BBCH 14-87). La aplicación del producto se realizará de forma preventiva cuando el nivel de la enfermedad sea bajo
Berenjenas (aire libre e invernadero)	Mildiu	2,5	400-1000	21	
Patata	Mildiu, alternaria	2,5	400-1000	21	Realizar 1-4 aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días. Aplicar desde la cuarta hoja del tallo principal desplegada hasta fin de floración (BBCH 14-69). La aplicación del producto se realizará de forma preventiva cuando el nivel de la enfermedad sea bajo
Tabaco	Moho azul	2,5	400-1000	21	Realizar 1-3 aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días. Aplicar desde la segunda hoja verdadera del tallo principal desplegada hasta madurez completa (BBCH 12-89). La aplicación del producto se realizará de forma preventiva cuando el nivel de la enfermedad sea bajo

FICHA TÉCNICA

MODO DE EMPLEO

Aplicar el producto mediante pulverización normal con tractor, manual con lanza o pistola y mochila en todos los usos autorizados al aire libre. Para los usos autorizados en invernadero aplicar mediante pulverización manual con lanza o pistola y mochila. Aplicar un volumen de pulverización suficiente para cubrir completamente todas las partes de la planta susceptibles de infección. El volumen necesario dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y del estado de desarrollo del follaje. La lluvia o el riego en las 2 horas posteriores a la aplicación pueden reducir la eficacia.

PREPARACIÓN DEL CALDO: Llenar el tanque con agua hasta la mitad y verter la cantidad necesaria de producto, manteniendo el agitador en marcha hasta completar con el resto de agua necesaria. Se recomienda preparar la cantidad de caldo a utilizar, evitando guardar el sobrante para aplicaciones posteriores.

PRECAUCIONES

Se aconseja que, a ser posible, los programas de fumigación incluyan fungicidas con diferentes modos de acción para prevenir la aparición de resistencias. Para optimizar la actividad sistémica del preparado restrinja su uso a la etapa de crecimiento rápido de la planta (por ejemplo, en pre- floración en patata, desde la 4ª hoja del tallo principal desplegada). Para otros casos y en particular cuando el follaje esté desarrollado, utilice fungicidas que no pertenezcan al grupo de las fenilamidas. Debido a la imposibilidad de prever la aparición de resistencias, la Compañía no asume ninguna responsabilidad derivada de la presencia de cepas resistentes a Metalaxil. Manténgase el recipiente en lugar fresco y seco, alejado de llamas o chispas.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente.