

CULTIVO	ENFERMEDAD	CONDICIONES DE USO
Almendro	Abolladura, Cribado, Monilia, Moteado, Bacteriosis	<p>1 aplicación por campaña. Aplicar desde el comienzo de la decoloración de las hojas (BBCH 92) hasta el principio del desarrollo de la yema (BBCH 00). Desde la cosecha hasta prefloración.</p> <p><b>Dosis por aplicación:</b> 0.25-0.3% (2-2,88 l/ha); <b>Vol. de caldo:</b> 800-1000 l/ha</p>
Avellano, Nogal	Monilia, Bacteriosis	<p>1 aplicación por campaña. Aplicar desde el comienzo de la decoloración de las hojas (BBCH 92) hasta el principio del desarrollo de la yema (BBCH 00). Desde la cosecha hasta prefloración.</p> <p><b>Dosis por aplicación:</b> 0.25-0.3% (2-2,88 l/ha); <b>Vol. de caldo:</b> 800-1000 l/ha</p>
Berenjena, Tomate (aire libre e invernadero)	Mildiu, Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis	<p>Máximo 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 10 días. Aplicar durante todos los estadios del cultivo.</p> <p><b>Aire libre: Dosis por aplicación:</b> 0.25-0.3% (1,5-3 l/ha); <b>Vol. de caldo:</b> 600-1000 l/ha</p> <p><b>Invernadero: Dosis por aplicación:</b> 0.25-0.3% (1,5-1,6 l/ha); <b>Vol. de caldo:</b> 600-640 l/ha</p>
Espinacas y similares (aire libre)	Mildiu, Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis	<p>Máximo 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 10 días. Aplicar desde que la 1ª hoja verdadera está desplegada (BBCH 11) hasta que se alcanza el 10% de la masa foliar esperada típica de cada variedad (BBCH 41).</p> <p><b>Dosis por aplicación:</b> 0.25-0.3% (1,25-2,4 l/ha); <b>Vol. de caldo:</b> 500-800 l/ha</p>
Frutales de hueso	Abolladura, Cribado, Monilia, Moteado, Bacteriosis	<p>1 aplicación por campaña. Aplicar desde que las hojas comienzan a descolorarse (BBCH 92) hasta el principio del desarrollo de las yemas (BBCH 00). Desde la cosecha hasta prefloración.</p> <p><b>Dosis por aplicación:</b> 0.25-0.3% (2-2,88 l/ha); <b>Vol. de caldo:</b> 800-1000 l/ha</p>
Frutales de pepita	Moteado, Monilia, Bacteriosis	<p>1 aplicación por campaña. Aplicar desde que las hojas comienzan a descolorarse (BBCH 92) hasta el principio del desarrollo de las yemas (BBCH 00). Desde la cosecha hasta prefloración.</p> <p><b>Dosis por aplicación:</b> 0.25-0.3% (2-2,88 l/ha); <b>Vol. de caldo:</b> 800-1000 l/ha</p>
Lechuga y similares (aire libre)	Mildiu, Alternaria, Antracnosis, Bacteriosis	<p>Máximo 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 10 días. Aplicar desde que la 1ª hoja verdadera está desplegada (BBCH 11) hasta que se alcanza el 10% de la masa foliar esperada típica de cada variedad (BBCH 41).</p> <p><b>Dosis por aplicación:</b> 0.25-0.3% (1,25-2,4 l/ha); <b>Vol. de caldo:</b> 500-800 l/ha</p>
Olivo	Repilo, Tuberculosis	<p>Máximo 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 60 días. Aplicar desde el comienzo del desarrollo de las hojas (BBCH 10) hasta que aumenta la coloración específica de los frutos</p>

		<p>(BBCH 85), realizando una aplicación en primavera y la otra en otoño. Si se hacen las dos aplicaciones en primavera el intervalo entre aplicaciones será de 10 días.</p> <p><b>Dosis por aplicación:</b> 0,25% (2 l/ha); Vol. de caldo: 800 l/ha</p> <p>Se podrá realizar también una única aplicación a una dosis de 0,25-0,3% (2-2,6 l/ha); <b>Vol. de caldo:</b> 800-1000 l/ha</p>
Ornamentales herbáceas (aire libre)	Mildiu	<p>Máximo 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 14 días. Aplicar durante todos los estadíos del cultivo.</p> <p><b>Dosis por aplicación:</b> 0.25-0.3% (1,25-3 l/ha); <b>Vol. de caldo:</b> 500-1000 l/ha</p>
Ornamentales leñosas (aire libre)	Mildiu	<p>Máximo 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 14 días. Aplicar durante todos los estadíos del cultivo.</p> <p><b>Dosis por aplicación:</b> 0.25-0.3% (1,25-2,88 l/ha); <b>Vol. de caldo:</b> 500-1000 l/ha</p>
Patata	Mildiu, Alternaria	<p>Máximo 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 10 días. Aplicar durante todos los estadíos del cultivo.</p> <p><b>Dosis por aplicación:</b> 0.25-0.3% (1,5-2,4 l/ha); <b>Vol. de caldo:</b> 600-800 l/ha</p>
Vid de mesa	Mildiu, Bacteriosis	<p>Máximo 3 aplicaciones por campaña, con un intervalo de 10 días. Aplicar desde 3 hojas desplegadas (BBCH 13) hasta bayas listas para recolectarse (BBCH 89). Desde prefloración a cosecha.</p> <p><b>Dosis por aplicación:</b> 0.25% (1,5 l/ha); <b>Vol. de caldo:</b> 600 l/ha</p>
Vid de vinificación	Mildiu, Bacteriosis	<p>Máximo 3 aplicaciones con intervalo de 10 días. Aplicar desde 3 hojas desplegadas (BBCH 13) hasta bayas listas para recolectarse (BBCH89). Desde prefloración hasta cosecha.</p> <p><b>Dosis por aplicación:</b> 0.25% (1,8 l/ha); <b>Vol. de caldo:</b> 720 l/ha</p>

#### Plazo de seguridad:

- **Berenjena y Tomate:** 10 días (aire libre) y 3 días (invernadero).
- **Espinaca y similares, Lechuga y similares, Olivo, Patata, Vid:** 15 días.
- **Frutales de hueso, Frutales de pepita, Almendro, Avellano, Nogal, Ornamentales:** No procede