Modo de empleo:

En cultivos al aire libre, aplicar el producto mediante pulverización normal con tractor o bien manual. En cultivos en invernadero, aplicar mediante pulverización manual. Aplicar en pulverización a la dosis recomendada, diluido en la conveniente cantidad de agua según técnica de aplicación adaptando la dosis según severidad de la plaga y estado de las orugas, y sin superar 1.5 kg/ha de producto en frutales, platanera y cítricos y 1 kg/ha en el resto de cultivos. Se debe mojar bien el cultivo. El momento más oportuno para su aplicación es el principio del desarrollo de las larvas. No dejar el caldo en reposo más de 12 horas.

- **Acelga, Alcachofa, Espinaca, Fresal, Platanera, Puerro**: Uso al aire libre contra Heliothis, Plusia, Spodoptera y otras orugas, desde la eclosión de larvas (L1).
- **Algodón, Cítricos, Melocotonero, Olivo**: Uso al aire libre, desde la eclosión de larvas (L1).
- **Arroz**: Uso al aire libre contra Spodoptera, Mythimna unipuncta y otras orugas, desde la eclosión de larvas (L1).
- **Cucurbitáceas de piel comestible**: Uso al aire libre e invernadero en pepino y calabacín contra Heliothis, Plusia, Spodoptera y otras orugas, desde la eclosión de larvas (L1).
- **Cucurbitáceas de piel no comestible:** Uso al aire libre en melón y sandía contra Heliothis, Plusia, Spodoptera, Tuta y otras orugas, desde la eclosión de larvas (L1).
- **Frutales de pepita**: Uso al aire libre en manzano y peral, desde la eclosión de larvas (L1).
- **Hortalizas del género brassica**: Uso al aire libre en Brócoli, col, coliflor y col china contra Heliothis, Plusia, Spodoptera y otras orugas, desde la eclosión de larvas (L1).
- **Judías verdes**: Uso al aire libre e invernadero contra Heliothis, Plusia, Spodoptera, Tuta y otras orugas, desde la eclosión de larvas (L1).
- **Lechugas y similares**: Uso al aire libre en lechuga y escarola contra Heliothis, Plusia, Spodoptera y otras orugas, desde la eclosión de larvas (L1).
- **Ornamentales herbáceas**: Uso al aire libre e invernadero en clavel, geranio, gerbera, hibiscus y rosal contra Heliothis, Plusia, Spodoptera, Tuta y otras orugas, desde la eclosión de larvas (L1).
- **Solanáceas**: Uso al aire libre e invernadero en tomate, pimiento y berenjena contra Heliothis, Plusia, Spodoptera, Tuta y otras orugas, desde la eclosión de larvas (L1).
- **Vid**: Uso al aire libre, desde “etapa de ojo negro” de larvas 2 días antes de la eclosión.